

6 ЗАБОЛЕВАНИЯ РОГОВИЦЫ И СКЛЕРЫ

Вопрос

1 Средний диаметр роговицы взрослого человека в норме равен:

Варианты ответов

- 1 8-9 мм (балл - 0)
- 2 10 мм (балл - 0)
- 3 11-12 мм (балл - 9)
- 4 13-14 мм (балл - 0)
- 5 15-16 мм (балл - 0)

2 Средняя величина преломляющей силы роговицы взрослого человека равна:

Варианты ответов

- 1 23 диоптриям (балл - 0)
- 2 30 диоптриям (балл - 0)
- 3 43 диоптриям (балл - 9)
- 4 50 диоптриям (балл - 0)
- 5 53 диоптриям (балл - 0)

3 Средняя величина радиуса кривизны передней поверхности роговицы взрослого человека составляет:

Варианты ответов

- 1 9 мм (балл - 0)
- 2 7,7-7,8 мм (балл - 9)
- 3 6,7-6,8 мм (балл - 0)
- 4 5,5 мм (балл - 0)
- 5 5 мм (балл - 0)

4 Нормальная толщина центральной части роговицы взрослого человека равна:

Варианты ответов

- 1 1,5 мм (балл - 0)
- 2 1,2 мм (балл - 0)
- 3 0,7-0,8 мм (балл - 0)
- 4 0,5-0,6 мм (балл - 9)
- 5 0,4 мм (балл - 0)

5 Для измерения радиуса кривизны и преломляющей силы роговицы применяется:

Варианты ответов

- 1 офтальмометр (балл - 9)
- 2 рефрактометр (балл - 0)
- 3 офтальмоскоп (балл - 0)
- 4 ретинофот (балл - 0)
- 5 диоптриметр (балл - 0)

6 Для измерения толщины роговицы применяется:

Варианты ответов

- 1 офтальмометр (балл - 0)
- 2 кератопахометр (балл - 9)
- 3 ксратометр (балл - 0)
- 4 рефрактометр (балл - 0)
- 5 эстезиометр (балл - 0)

7 Сочетание признаков - светобоязнь, слезотечение, блефароспазм, боль в глазу - характерно для:

Варианты ответов

- 1 катаракты (балл - 0)
- 2 кератита (балл - 9)
- 3 отслойки сетчатки (балл - 0)
- 4 атрофии зрительного нерва (балл - 0)
- 5 тромбоза центральной вены сетчатки (балл - 0)

8 Наличие перикорнеальной инъекции глазного яблока, шероховатой поверхности роговицы, нарушения тактильной чувствительности роговицы, инфильтратов в роговице и васкуляризации роговицы характерно для:

Варианты ответов

- 1 тромбоза центральной зоны сетчатки (балл - 0)
- 2 дегенерации желтого пятна (балл - 0)
- 3 катаракты (балл - 0)
- 4 диабетической ретинопатии (балл - 0)
- 5 кератита (балл - 9)

9 При центральной язве роговицы с угрозой ее прободения показано:

Варианты ответов

- 1 хирургическое лечение в плановом порядке (балл - 0)
- 2 консервативное лечение (балл - 0)
- 3 срочное хирургическое лечение (балл - 9)
- 4 динамическое наблюдение (балл - 0)
- 5 инстилляций и инъекции кортикостероидов (балл - 0)

10 При операциях на роговице предпочтительно накладывать швы из:

Варианты ответов

- 1 шелка туркменского (балл - 0)
- 2 шелка виргинского (балл - 0)
- 3 нейлона (балл - 9)
- 4 кетгута (балл - 0)
- 5 любого из вышеперечисленных материалов (балл - 0)

11 Оптимальный срок для снятия швов после субтотальной сквозной кератопластики:

Варианты ответов

- 1 3-4 недели (балл - 0)
- 2 1-2 месяца (балл - 0)
- 3 3-4 месяца (балл - 0)
- 4 4-5 месяцев (балл - 0)
- 5 6 месяцев и более (балл - 9)

12 Сочетание признаков – снижение остроты зрения, невозможность коррекции зрения очковыми стеклами, уменьшение радиуса кривизны роговицы, наличие неправильного роговичного астигматизма характерно для:

Варианты ответов

- 1 кератита (балл - 0)
- 2 катаракты (балл - 0)
- 3 кератоконуса (балл - 9)
- 4 склерита (балл - 0)
- 5 пингвекулы (балл - 0)

13 Для кератоконуса характерны:

Варианты ответов

- 1 гиперметропия (балл - 0)
- 2 правильный астигматизм (балл - 0)
- 3 неправильный астигматизм (балл - 9)
- 4 повышенное внутриглазное давление (балл - 0)
- 5 пониженное внутриглазное давление (балл - 0)

14 При кератоконусе в далеко зашедшей стадии возможна коррекция зрения:

Варианты ответов

- 1 сферическими очками (балл - 0)
- 2 бифокальными очками (балл - 0)
- 3 контактными линзами (балл - 9)
- 4 цилиндрическими очками (балл - 0)
- 5 сферопризматическими очками (балл - 0)

15 Поверхностная васкуляризация роговицы встречается при:

Варианты ответов

- 1 фликтенулезном кератите (балл - 9)
- 2 аденовирусном конъюнктивите (балл - 0)
- 3 склерите (балл - 0)
- 4 эписклерите (балл - 0)
- 5 кератоконусе (балл - 0)

16 Проявлением болезни Сьёгрена со стороны органа зрения является:

Варианты ответов

- 1 склерит (балл - 0)
- 2 повышение внутриглазного давления (балл - 0)
- 3 сухой кератоконъюнктивит (балл - 9)
- 4 отслойка сетчатки (балл - 0)
- 5 кератоконус (балл - 0)

17 При пробе Ширмера нормальным результатом, не вызывающим подозрения на нарушение функции, является:

Варианты ответов

- 1 смачивание полоски фильтрованной бумаги на 5 мм и меньше (балл - 0)
- 2 смачивание полоски фильтрованной бумаги на 5-10 мм (балл - 0)
- 3 смачивание полоски фильтрованной бумаги 10 мм и более (балл - 9)
- 4 полное отсутствие смачивания фильтрованной бумаги (балл - 0)
- 5 смачивание полоски фильтровальной бумаги на 3 мм (балл - 0)

18 При начальных проявлениях сухого кератоконъюнктивита предпочтительнее всего назначать инстилляцию:

Варианты ответов

- 1 кортикостероидов (балл - 0)
- 2 антибиотиков (балл - 0)
- 3 сульфаниламидов (балл - 0)
- 4 миотиков (балл - 0)
- 5 препаратов искусственной слезы (балл - 9)

19 При болезни Вегенера (гранулематоз неинфекционный некротический) наиболее частым проявлением со стороны глаз является:

Варианты ответов

- 1 кератоконус (балл - 0)
- 2 краевой язвенный кератит (балл - 9)
- 3 микрокорнеа (балл - 0)
- 4 врожденная катаракта (балл - 0)

5 повышение ВГД (балл - 0)

20 Отложения жира в роговице могут обнаружиться при:

Варианты ответов

- 1 кольца Кайзер-Флейшера (балл - 0)
- 2 линии Стоккера (балл - 0)
- 3 старческой дуге (балл - 9)
- 4 линии Хадсон-Штали (балл - 0)
- 5 кольца Флейшера (балл - 0)

21 Жесткие контактные линзы эффективны при:

Варианты ответов

- 1 рецидивирующей эрозии роговицы (балл - 0)
- 2 буллезной кератопатии (балл - 0)
- 3 кератоконусе (балл - 9)
- 4 сухом кератоконъюнктивите (балл - 0)
- 5 язве роговицы (балл - 0)

22 Противопоказанием к назначению контактных линз является:

Варианты ответов

- 1 нарушение эпителия роговицы (балл - 9)
- 2 гипертоническая болезнь (балл - 0)
- 3 глазные операции в анамнезе (балл - 0)
- 4 тромбоз центральной вены сетчатки в анамнезе (балл - 0)
- 5 катаракта (балл - 0)

23 Проведение микродиатермокоагуляции показано при:

Варианты ответов

- 1 поверхностных и глубоких поражениях роговицы, протекающих с изъязвлением (балл - 9)
- 2 наличии у больных выраженных явлений местной медикаментозной аллергии (балл - 0)
- 3 наличии признаков диффузной воспалительной инфильтрации, захватывающей большую часть площади роговицы (балл - 0)
- 4 помутнении роговицы (балл - 0)
- 5 десцеметите (балл - 0)

24 В лечении поверхностных форм герпетического кератита наиболее эффективно применение:

Варианты ответов

- 1 интерферонов и интерферонов (балл - 9)
- 2 кортикостероидов (балл - 0)
- 3 антибиотиков (балл - 0)
- 4 антиоксидантов (балл - 0)
- 5 витаминов (балл - 0)

25 Введение полудана в переднюю камеру показано при:

Варианты ответов

- 1 кератоиридоциклитах с изъязвлением передней поверхности роговицы (балл - 0)
- 2 увеакератитах с изъязвлением задней поверхности роговицы (балл - 9)
- 3 изолированных иридоциклитах и увеитах (балл - 0)
- 4 наличии патогенной микрофлоры в посевах конъюнктив (балл - 0)
- 5 вирусном конъюнктивите (балл - 0)

26 Неспецифическая противовирусная терапия проводится:

Варианты ответов

- 1 полуданом (балл - 9)
- 2 офтан-ИДУ (балл - 0)
- 3 противогерпетической поливакциной (балл - 0)
- 4 ацикловиром (балл - 0)
- 5 дексаметазоном (балл - 0)

27 Применение кортикостероидов показано при:

Варианты ответов

- 1 древовидном кератите (балл - 0)
- 2 ландкартообразном кератите (балл - 0)
- 3 рецидивирующей эрозии роговицы (балл - 0)
- 4 дисковидном кератите (балл - 9)
- 5 везикулезном кератите (балл - 0)

28 В начальной стадии кератоконуса показано:

- 1) коррекция зрения сферопризматическими очками
- 2) контактная коррекция зрения
- 3) термокератопластика
- 4) послойная кератопластика
- 5) динамическое наблюдение

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 9)

29 При кольце Флейшера обнаруживается:

- 1) дегенерация в подлежащей Боуменовой мембране
- 2) желтоватое кольцо или дуга у основания конуса при кератоконусе
- 3) отложении железа в глубоких слоях роговицы
- 4) низкая острота зрения
- 5) кератоконус развитой или далекозашедшей стадии

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 9)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 0)

30 При склерите характерно:

- 1) повреждение склерального покрова
- 2) наличие боли
- 3) болезнь соединительной ткани
- 4) не требует срочного хирургического лечения
- 5) истончение склеры

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)

- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 9)

31 Для переднего склерита характерно:

- 1) может развиваться в стафилому
- 2) может развиваться в ангулярный склерит
- 3) характеризуется длительным течением
- 4) часто изъязвляется
- 5) требует срочного оперативного вмешательства

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 9)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 0)

32 Для врожденной кисты склеры характерно:

- 1) редко встречается
- 2) мала при рождении
- 3) увеличивается в размерах по мере роста человека
- 4) выстлана эпителиальными клетками
- 5) расположена по центру роговицы

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 9)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 0)

33 При старческой роговичной дуге справедливо:

- 1) имеется у 3/4 пациентов в возрасте старше 50 лет
- 2) бывает иногда и у 30-40-летних пациентов
- 3) ограничивается эпителием роговины
- 4) требует хирургического лечения
- 5) доходит до лимба

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 9)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 0)

34 При центральных язвах роговицы справедливо следующее:

- 1) клиническое течение тяжелее, чем при периферических
- 2) имеют бактериальное происхождение
- 3) имеют герпетическое происхождение
- 4) могут быть некротическими
- 5) часто требует хирургического лечения

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 9)

35 При увеличенной роговице (мегалокорнеа) справедливо следующее:

- 1) роговица может быть прозрачной
- 2) имеется врожденное помутнение края роговицы у лимба
- 3) передняя камера увеличена
- 4) часто бывает подвывих хрусталика
- 5) значительно снижена острота зрения

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 9)

36 При язвах роговицы грибкового происхождения справедливо:

- 1) часто резистентны к антибиотикам
- 2) появляются после выскабливания
- 3) окружены ореолом разжижения
- 4) кортикостероиды не улучшают клиническое течение
- 5) часто резистентны к сульфаниламидам

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 9)

37 Трахома характеризуется следующими проявлениями:

- 1) незрелые фолликулы на верхней пластинке хряща века
- 2) эпителиальный кератит
- 3) образование паннуса (мембраноподобной васкуляризации)
- 4) значительное снижение зрения
- 5) образование рубцовой ткани с осложнениями на веке

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 9)

38 При врожденной лейкоме роговицы характерно:

- 1) причиной является внутриутробное воспаление
- 2) имеется васкуляризация
- 3) могут быть передние синехии
- 4) может сопровождаться повышенным ВГД

5) отмечается амблиопия

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 9)

39 При лентовидной дистрофии роговицы справедливо следующее:

- 1) встречается у детей
- 2) связана с артритом и иритом
- 3) появляется в области интерпальпебральной щели
- 4) острота зрения значительно снижена
- 5) при биомикроскопии обнаруживаются темные «дыры» в Боуеновой мембране

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 9)

40 При решетчатой дистрофии роговицы имеет место:

- 1) линии стромы представляют дегенерированные нервы роговицы
- 2) чувствительность роговицы постепенно снижается
- 3) эпителий становится шероховатым, огрубевшим
- 4) острота зрения снижается значительно
- 5) отсутствуют признаки воспаления

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 9)

41 Для пигментного кольца Кайзер-Флейшера при болезни Вильсона справедливо:

- 1) расположено в десцеметовой мембране
- 2) является отложением меди
- 3) эндотелий прозрачен
- 4) не требует срочного хирургического лечения
- 5) имеет диагностическое значение

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 9)

42 При остром кератоконусе справедливо:

- 1) сопровождается внезапным значительным снижением зрения
- 2) сопровождается значительным отеком роговицы
- 3) после купирования острого процесса дает улучшение зрения
- 4) отек роговицы является обратимым
- 5) происходит от гидратации роговицы вследствие разрыва десцеметовой мембраны

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 9)

43 Сифилитический кератит сопровождается:

- 1) ранним появлением боли и светобоязни
- 2) образованием синехий
- 3) стромальной пленкой, наиболее плотной в центре
- 4) снижается острота зрения
- 5) повышением внутриглазного давления

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 9)

44 При эпидемическом кератоконъюнктивите может наблюдаться следующее:

- 1) острый фолликулярный конъюнктивит
- 2) симптомы общей инфекционной интоксикации организма
- 3) снижение остроты зрения
- 4) смешанная инъекция глазного яблока
- 5) повреждение роговицы в виде субэпителиальных круглых ин фильтратов

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 9)

45 При кольце (линии) Флейшера в роговице может наблюдаться:

- 1) дегенерация в Боуменовой мембране
- 2) желтовато-зеленое кольцо у основания кератоконуса
- 3) желтовато-зеленой дуги у основания кератоконуса
- 4) значительное снижение остроты зрения
- 5) значительная степень выпячивания роговицы

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)

5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 9)

46 Признаками нейропаралитического кератита являются:

- 1) светобоязнь
- 2) слезотечение
- 3) эрозия роговицы с последующим изъязвлением
- 4) снижение остроты зрения
- 5) блефароспазм

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 9)

47 Преимуществом контактных линз перед очками является:

- 1) более широкое поле зрения
- 2) близкая к нормальной величина изображения
- 3) косметическое преимущество
- 4) более высокая острота зрения
- 5) возможность исправления неправильного астигматизма

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 9)

48 При синдроме «сухих глаз» для диагностики важно:

- 1) осмотр обнаженной полоски, где должен быть непрерывный поток слез
- 2) проба Ширмера, основанная на скорости смачивания полоски фильтрованной бумаги, прикрепляемой над краевой границей века
- 3) проба с красителем, состоящая из закапывания известного заранее количества флюоресцеина, вслед за чем проводится флюорометрия
- 4) окраска Бенгальской розой
- 5) анамнез заболевания

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 9)

49 Для синдрома Сьегрена характерно:

- 1) поражение слюнных и слезных желез
- 2) развитие сухого кератоконъюнктивита
- 3) светобоязнь
- 4) снижение зрения
- 5) болевой синдром

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 9)

50 Для синдрома Сьегрена характерны все перечисленные признаки, кроме:

- а) инъекции конъюнктивы
- б) прогрессирующих ксеротических изменений роговицы
- в) появления светобоязни
- г) снижение остроты зрения
- д) появления болевого синдрома

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 9)

51 Для роговичного синдрома характерно:

- 1) светобоязнь
- 2) блефароспазм
- 3) ощущение инородного тела под веками
- 4) снижение остроты зрения
- 5) слезотечение

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 9)

52 Для диагностики офтальмогерпеса являются важно:

- 1) цитологическая диагностика
- 2) очаговые аллергические реакции
- 3) метод флюоресцирующих антител
- 4) сбор анамнеза
- 5) забор крови на вирусемию

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 9)

53 Для лечения внутриглазного герпеса:

- 1) химиотерапевтические средства
- 2) неспецифические противовирусные средства
- 3) иммунокорректирующие средства
- 4) хирургические методы лечения

5) специфические противовирусные средства
ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)

2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)

3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)

4 если правильный ответ 4 (балл - 0)

5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 9)