

КОНСЕРВАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

Вопрос

1 Ретробульбарные и парабульбарные инъекции показаны при:

Варианты ответов

- 1 острых конъюнктивитах; (балл - 0)
- 2 заболеваниях радужки, стекловидного тела, сетчатки ; (балл - 9)
- 3 заболеваниях слезного мешка; (балл - 0)
- 4 заболеваниях век; (балл - 0)
- 5 повышении офтальмотонуса; (балл - 0)

2 Подконъюнктивальные инъекции показаны при:

Варианты ответов

- 1 заболеваниях век; (балл - 0)
- 2 заболеваниях слезоотводящих путей; (балл - 0)
- 3 заболеваниях роговицы ; (балл - 9)
- 4 острых заболеваниях зрительного нерва; (балл - 0)
- 5 хронических заболеваниях зрительного нерва; (балл - 0)

3 Введение лекарственных веществ в переднюю камеру производится при:

Варианты ответов

- 1 заболеваниях слезоотводящих путей; (балл - 0)
- 2 остром приступе глаукомы; (балл - 0)
- 3 хирургических вмешательствах ; (балл - 9)
- 4 хронических заболеваниях век; (балл - 0)
- 5 заболеваниях зрительного нерва; (балл - 0)

4 В случае побочного действия лекарственных веществ при местном введении в ткани глаза:

Варианты ответов

- 1 препарат отменяется; (балл - 9)
- 2 продолжается лечение ; (балл - 0)
- 3 увеличивается концентрация лекарственного препарата; (балл - 0)
- 4 уменьшается количество лекарственного вещества; (балл - 0)
- 5 прежняя доза сочетается с другим препаратом; (балл - 0)

5 Миотики назначаются при:

Варианты ответов

- 1 ирите ; (балл - 0)
- 2 глаукоме; (балл - 9)
- 3 конъюнктивите с выраженной светобоязнью; (балл - 0)
- 4 невралгии; (балл - 0)

6 Мидриатики назначаются при:

Варианты ответов

- 1 закрытоугольной глаукоме; (балл - 0)
- 2 аллергическом конъюнктивите; (балл - 0)
- 3 травматическом мидриазае ; (балл - 0)
- 4 ирите; (балл - 9)
- 5 невралгии; (балл - 0)

7 Местноанестезирующие средства применяются при:

Варианты ответов

- 1 гониоскопии, тонометрии, удалении инородных тел роговицы; (балл - 9)

- 2 периметрии, проверке остроты зрения; (балл - 0)
- 3 взятии мазка с конъюнктивы ; (балл - 0)
- 4 язвенном блефарите; (балл - 0)
- 5 эрозии роговицы; (балл - 0)

8 Сосудорасширяющие средства назначают при:

Варианты ответов

- 1 острых иритах ; (балл - 0)
- 2 флегмонах слезного мешка; (балл - 0)
- 3 склеротических процессах в сетчатке и зрительном нерве; (балл - 9)
- 4 язвенных блефаритах; (балл - 0)
- 5 язве роговицы; (балл - 0)

9 Рассасывающие средства назначают при:

Варианты ответов

- 1 онкологических заболеваниях; (балл - 0)
- 2 затяжном приступе глаукомы ; (балл - 0)
- 3 конъюнктивите; (балл - 0)
- 4 кровоизлиянии в сетчатку или стекловидное тело; (балл - 9)
- 5 флегмоне слезного мешка; (балл - 0)

10 Показаниями к назначению прижигающих и вяжущих средств являются:

Варианты ответов

- 1 тромбозы; (балл - 0)
- 2 кератиты, конъюнктивиты; (балл - 9)
- 3 катаракта; (балл - 0)
- 4 глаукома ; (балл - 0)
- 5 невриты; (балл - 0)

11 При хирургическом лечении доза инсулина в день операции:

Варианты ответов

- 1 снижается ; (балл - 9)
- 2 повышается; (балл - 0)
- 3 остается без изменения; (балл - 0)
- 4 дополняется таблетированными препаратами; (балл - 0)
- 5 доза инсулина зависит от степени компенсации диабета; (балл - 0)

12 Показаниями к назначению гормональных препаратов щитовидной железы являются:

Варианты ответов

- 1 неврит зрительного нерва; (балл - 0)
- 2 отечный экзофтальм; (балл - 9)
- 3 травматический эндофтальм ; (балл - 0)
- 4 хронический ирит; (балл - 0)
- 5 травматический экзофтальм; (балл - 0)

13 Диуретические и дегидратационные средства показаны при:

Варианты ответов

- 1 дистрофических процессах; (балл - 0)
- 2 повышении внутриглазного давления; (балл - 9)
- 3 рецидивирующих ячменях; (балл - 0)
- 4 иритах ; (балл - 0)
- 5 катаракте; (балл - 0)

14 Спазмолитические, сосудорасширяющие средства и средства воздействующие на микроциркуляцию, показаны при:

Варианты ответов

- 1 воспалительных заболеваниях переднего отрезка глазного яблока; (балл - 0)
- 2 проникающих травмах; (балл - 0)
- 3 сосудистой патологии заднего отрезка глазного яблока ; (балл - 9)
- 4 заболеваниях слезовыделительной системы; (балл - 0)
- 5 глаукоме; (балл - 0)

15 Вещества гипохолестеринемического действия назначают с целью:

Варианты ответов

- 1 снизить холестерин в крови; (балл - 0)
- 2 повысить билирубин крови ; (балл - 9)
- 3 нормализовать белковый обмен; (балл - 0)
- 4 нормализовать углеводный обмен; (балл - 0)
- 5 нормализовать все виды обмена; (балл - 0)

16 Ангиопротекторы назначают с целью:

Варианты ответов

- 1 ликвидировать процессы воспаления; (балл - 0)
- 2 снизить внутриглазное давление ; (балл - 0)
- 3 укрепить сосудистую стенку; (балл - 9)
- 4 улучшить проходимость слезных путей; (балл - 0)
- 5 ускорить заживление раневого канала в роговице; (балл - 0)

17 К ангиопротекторам относятся:

Варианты ответов

- 1 никошпан, но-шпа, диакарб; (балл - 0)
- 2 доксиум, дицинон, витамин «С», аскорутин; (балл - 9)
- 3 гирудотерапия ; (балл - 0)
- 4 миотики; (балл - 0)
- 5 мидриатики; (балл - 0)

18 Гирудотерапия применяется с целью:

Варианты ответов

- 1 снижения ВГД, ускорения рассасывания кровоизлияний и экссудатов; (балл - 9)
- 2 повышения свертывания крови; (балл - 0)
- 3 повышения уровня гемоглобина ; (балл - 0)
- 4 лечения слезотечения; (балл - 0)
- 5 лечения катаракты; (балл - 0)

19 Биогенные стимуляторы назначаются при:

Варианты ответов

- 1 онкологических заболеваниях переднего отрезка глаза; (балл - 0)
- 2 онкологических заболеваниях заднего отрезка глазного яблока; (балл - 0)
- 3 хориоретинальных дистрофиях ; (балл - 9)
- 4 лечении катаракты; (балл - 0)
- 5 флегмоне слезного мешка; (балл - 0)

20 Ультрафиолетовое облучение в офтальмологии показано при:

Варианты ответов

- 1 глаукоме; (балл - 0)

- 2 катаракте ; (балл - 0)
- 3 флегмоне слезного мешка; (балл - 9)
- 4 заращении слезно-носового канала; (балл - 0)
- 5 деструкции стекловидного тела; (балл - 0)

21 Применение лазера в офтальмологии показано при:

Варианты ответов

- 1 острым приступе глаукомы (закрытоугольной); (балл - 0)
- 2 острым конъюнктивите; (балл - 0)
- 3 острым ирите ; (балл - 9)
- 4 деструкции стекловидного тела; (балл - 0)
- 5 дакриoadените; (балл - 0)

22 Из перечисленных заболеваний применение терапевтического лазера показано при:

Варианты ответов

- 1 врожденной катаракте ; (балл - 9)
- 2 старческой зрелой катаракте; (балл - 0)
- 3 старческой субкапсулярной катаракте; (балл - 0)
- 4 дакриoadените; (балл - 0)
- 5 заращении слезно-носового канала; (балл - 0)

23 Из перечисленных заболеваний применение терапевтического лазера показано при:

Варианты ответов

- 1 гнойных конъюнктивитах; (балл - 0)
- 2 вирусных кератитах; (балл - 0)
- 3 кератоконусе ; (балл - 9)
- 4 зияющей ране роговицы; (балл - 0)
- 5 ране роговицы с выпадением радужки; (балл - 0)

24 Переменное магнитное поле показано при:

Варианты ответов

- 1 заболевании роговицы, сетчатки; (балл - 0)
- 2 заболевании радужки, стекловидного тела ; (балл - 9)
- 3 заболевании век; (балл - 0)
- 4 непроходимости слезно-носового канала; (балл - 0)
- 5 внутриглазных опухолях; (балл - 0)

25 Криотерапия в офтальмологии показана при:

Варианты ответов

- 1 острым приступе глаукомы на абсолютно болящем глазу; (балл - 9)
- 2 острым ирите; (балл - 0)
- 3 хроническом ирите ; (балл - 0)
- 4 флегмоне слезного мешка; (балл - 0)
- 5 проникающем ранении роговицы с выпадением радужки; (балл - 0)

26 Криотерапия в офтальмологии показана при:

Варианты ответов

- 1 хроническом ирите ; (балл - 9)
- 2 вирусном кератите; (балл - 0)
- 3 дакриоцистите; (балл - 0)
- 4 врожденной катаракте; (балл - 0)
- 5 диабетической ретинопатии; (балл - 0)

27 Лечебные мягкие контактные линзы:

Варианты ответов

- 1 нормализуют внутриглазное давление, оказывают противовоспалительное действие, расширяют зрачок; (балл - 0)
- 2 улучшают микроциркуляцию; (балл - 0)
- 3 исправляют косоглазие ; (балл - 9)
- 4 рассасывают старческую катаракту; (балл - 0)
- 5 рассасывают врожденную катаракту; (балл - 0)

28 Баротерапия показана при:

Варианты ответов

- 1 острых воспалительных заболеваниях; (балл - 0)
- 2 проникающих ранениях глаза; (балл - 0)
- 3 сосудистых заболеваниях органа зрения ; (балл - 9)
- 4 наличии внутриглазного инородного тела металлического характера; (балл - 0)
- 5 наличии внутриглазного инородного тела синтетической природы; (балл - 0)

29 Рефлексотерапия в офтальмологии применяется:

Варианты ответов

- 1 как самостоятельный вид терапии ; (балл - 9)
- 2 как вспомогательный вид терапии; (балл - 0)
- 3 рефлексотерапия не целесообразна; (балл - 0)
- 4 только в раннем периоде заболевания; (балл - 0)

30 Рефлексотерапия показана при:

Варианты ответов

- 1 заболевании нейрососудистого генеза; (балл - 9)
- 2 острых воспалительных заболеваниях; (балл - 0)
- 3 травмах роговицы; (балл - 0)
- 4 врожденной аниридии ; (балл - 0)
- 5 врожденной колобоме зрительного нерва; (балл - 0)

31 Побочное действие лекарственных веществ проявляется:

Варианты ответов

- 1 отеком кожи век, гиперемией, зудом кожи век, слезотечением, светобоязнью; (балл - 9)
- 2 снижением внутриглазного давления ; (балл - 0)
- 3 повышением ->-; (балл - 0)
- 4 деструкцией стекловидного тела; (балл - 0)
- 5 отслойкой ->-; (балл - 0)

32 В переднюю камеру вводятся препараты:

Варианты ответов

- 1 противовоспалительного действия, мидриатики, миотики; (балл - 9)
- 2 сосудорасширяющего действия ; (балл - 0)
- 3 ангиопротекторы; (балл - 0)
- 4 инсулин; (балл - 0)
- 5 витамины; (балл - 0)

33 Закапывание витаминсодержащих средств показано при:

Варианты ответов

- 1 заболевании роговицы, хрусталика; (балл - 9)

- 2 заболевании стекловидного тела ; (балл - 0)
- 3 заболевании зрительного нерва; (балл - 0)
- 4 деструкции стекловидного тела; (балл - 0)
- 5 дакриoadените; (балл - 0)

34 Светолечение показано при:

Варианты ответов

- 1 воспалительных заболеваниях переднего отрезка глазного яблока; (балл - 9)
- 2 дистрофических процессах в заднем полюсе глазного яблока; (балл - 0)
- 3 глаукоме; (балл - 0)
- 4 внутриглазных инородных телах; (балл - 0)
- 5 меланобластомах ; (балл - 0)

35 Осложнениями при ретробульбарной инъекции могут быть:

Варианты ответов

- 1 гематома, экзофтальм, гемофтальм ; (балл - 9)
- 2 ирит; (балл - 0)
- 3 абсцесс слезной железы; (балл - 0)
- 4 острый приступ глаукомы; (балл - 0)
- 5 повышение А\Д; (балл - 0)

36 При остром приступе глаукомы:

Варианты ответов

- 1 пилокарпин закапывают через каждый час; (балл - 9)
- 2 -»- -»- 3-4раза вдень; (балл - 0)
- 3 -»- не закапывают; (балл - 0)
- 4 применяется электрофорез с пилокарпином; (балл - 0)
- 5 закапывают пилокарпин в сочетании с альбуцидом ; (балл - 0)

37 Показаниями для назначения эмоксипина в виде парабульбарных инъекций являются:

Варианты ответов

- 1 флегмоны слезного мешка ; (балл - 0)
- 2 застойные диски зрительных нервов; (балл - 0)
- 3 отслойка сетчатки; (балл - 0)
- 4 внутриглазные опухоли; (балл - 0)
- 5 кровоизлияния в сетчатку, стекловидное тело; (балл - 9)

38 В стекловидное тело вводятся лекарственные препараты:

- 1) противовоспалительного действия;
- 2) антиглаукоматозного действия;
- 3) сосудорасширяющего -»-;
- 4) миотики;
- 5) мидриатики;

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3; (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3; (балл - 9)
- 3 если правильны ответы 2 и 4; (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4; (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5. (балл - 0)

39 Лечебная перилимбальная новокаиновая блокада производится при:

- 1) кератитах ;
- 2) иритах;

- 3) остром приступе глаукомы ;
- 4) ретинитах;
- 5) флегмоне слезного мешка;

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3; (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3; (балл - 9)
- 3 если правильны ответы 2 и 4; (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4; (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5. (балл - 0)

40 Лечебная ретробульбарная (парабульбарная) блокада проводится при:

- 1) конъюнктивитах;
- 2) абсолютной болящей глаукоме ;
- 3) дакриоцистите;
- 4) иритах ;
- 5) невритах;

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3; (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3; (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4; (балл - 9)
- 4 если правильный ответ 4; (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5. (балл - 0)

41 Введение лекарственных веществ путем электрофореза показано при:

- 1) остром приступе глаукомы ;
- 2) свежих кровоизлияниях в сетчатку и стекловидное тело;
- 3) незрелой катаракте ;
- 4) дистрофических заболеваниях сетчатки;
- 5) невритах зрительного нерва;

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3; (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3; (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4; (балл - 9)
- 4 если правильный ответ 4; (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5. (балл - 0)

42 Наиболее эффективным введением рассасывающих средств является:

- 1) внутримышечные инъекции ;
- 2) пара- и ретробульбарные инъекции ;
- 3) прием внутрь таблетированных препаратов ;
- 4) внутривенное введение препаратов;
- 5) в виде электрофореза;

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3; (балл - 9)
- 2 если правильны ответы 1 и 3; (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4; (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4; (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5. (балл - 0)

43 Инсулиновая мазь показана при состояниях::

- 1) диабетической ретинопатии ;
- 2) дистрофических кератитах ;
- 3) диабетическом иридоциклите ;

- 4) конъюнктивите;
- 5) флегмоне слезного мешка;

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3; (балл - 9)
- 2 если правильны ответы 1 и 3; (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4; (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4; (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5. (балл - 0)

44 Наиболее эффективно введение ферментного препарата в виде:

- 1) капель ;
- 2) пара- и ретробульбарных инъекций ;
- 3) мази ;
- 4) электрофореза;
- 5) суспензии;

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3; (балл - 9)
- 2 если правильны ответы 1 и 3; (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4; (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4; (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5. (балл - 0)

45 К средствам, влияющим на свертываемость крови, относятся:

- 1) мочевины ;
- 2) фениллин, эскузан, гепарин ;
- 3) ангинин ;
- 4) дицион;
- 5) солкосерил;

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3; (балл - 9)
- 2 если правильны ответы 1 и 3; (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4; (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4; (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5. (балл - 0)

46 Из перечисленных заболеваний применение лазера показано при:

- 1) диабетической флебопатии ;
- 2) диабетическом ирите ;
- 3) диабетическом рубеозе ;
- 4) диабетическом конъюнктивите;
- 5) диабетическом блефарите;

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3; (балл - 9)
- 2 если правильны ответы 1 и 3; (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4; (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4; (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5. (балл - 0)

47 Из перечисленных заболеваний применение лазера показано при:

- 1) плоской отслойке сетчатки ;
- 2) высокой отслойке сетчатки ;
- 3) ретиношизисе ;
- 4) старой, ригидной отслойке сетчатки;

5) тотальной отслойке сетчатки;

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3; (балл - 9)
- 2 если правильны ответы 1 и 3; (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4; (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4; (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5. (балл - 0)

48 При диабетических кровоизлияниях в сетчатку лазер эффективен в случае:

- 1) неоваскуляризации ;
- 2) старых (месячной давности) кровоизлияний ;
- 3) кровоизлияний годичной давности ;
- 4) часто рецидивирующих кровоизлияний ;
- 5) гифем ;

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3; (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3; (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4; (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4; (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5. (балл - 9)

49 Ультразвуковое исследование показано при:

- 1) отслойке сетчатки ;
- 2) свежих кровоизлияниях в сетчатку ;
- 3) старых кровоизлияниях в сетчатку (месячной давности) ;
- 4) проникающих ранениях роговицы;
- 5) кровоизлияниях в стекловидное тело;

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3; (балл - 9)
- 2 если правильны ответы 1 и 3; (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4; (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4; (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5. (балл - 0)

50 В слезоотводящие пути лекарственные вещества вводятся всеми перечисленными путями:

- 1) через нижнюю слезную точку;
- 2) через верхнюю слезную точку;
- 3) эндоназально;
- 4) закапыванием в конъюнктивальный мешок;
- 5) субконъюнктивальных инъекций;

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3; (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3; (балл - 9)
- 3 если правильны ответы 2 и 4; (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4; (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5. (балл - 0)

51 В стекловидное тело лекарственные вещества вводятся следующими путями:

- 1) через лимб ;
- 2) через плоскую часть цилиарного тела ;
- 3) вскрытием передней камеры ;
- 4) с помощью ультразвука;

5) с помощью переменного магнитного поля;

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3; (балл - 9)
- 2 если правильны ответы 1 и 3; (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4; (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4; (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5. (балл - 0)

52 При атропиновом психозе применяется:

- 1) снотворное, на язык пилокарпин ;
- 2) диакарб;
- 3) аминазин, седуксен ;
- 4) атропин в виде внутримышечных инъекций;
- 5) пирогенал внутримышечно;

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3; (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3; (балл - 9)
- 3 если правильны ответы 2 и 4; (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4; (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5. (балл - 0)

53 Показаниями для назначения солкосерила являются:

- 1) воспалительные заболевания переднего отрезка глаза ;
- 2) заболевания слезоотводящих путей;
- 3) дегенеративные хориоретинальные заболевания ;
- 4) проникающая травма с внутриглазным инородным телом;
- 5) внутриглазная опухоль;

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3; (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3; (балл - 9)
- 3 если правильны ответы 2 и 4; (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4; (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5. (балл - 0)

54 Показаниями для назначения тауфона в виде парабульбарных инъекций являются:

- 1) кератиты ;
- 2) катаракта ;
- 3) заболевания стекловидного тела, сетчатки ;
- 4) внутриглазные опухоли ;
- 5) внутриглазное инородное тело ;

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3; (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3; (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4; (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4; (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5. (балл - 9)

55 Лидаза при диабетической ангиоретинопатии назначается при:

- 1) геморрагической форме ;
- 2) пролиферативной ретинопатии ;
- 3) склеротической форме ;
- 4) отсутствию изменений сетчатки и сосудов;

5) флеботомии;

Варианты ответов

1 если правильны ответы 1,2 и 3; (балл - 9)

2 если правильны ответы 1 и 3; (балл - 0)

3 если правильны ответы 2 и 4; (балл - 0)

4 если правильный ответ 4; (балл - 0)

5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5. (балл - 0)